



PIMARICINA

Informativo Técnico



A. FORMA FARMACÊUTICA

Frasco conta-gotas com 5 mL de suspensão oftálmica estéril.

B. VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Uso oftálmico (Uso tópico).

C. INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. ESTABILIDADE

Manter a temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, em local seco e protegido da luz e umidade. Mantenha o frasco bem fechado e fora do alcance de crianças.

2. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações significativas com outros medicamentos oftálmicos, mas informe seu médico sobre qualquer outro colírio ou medicamento que esteja utilizando.

3. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Uso exclusivamente oftálmico. Não ingerir.

Pode causar visão turva temporária após a aplicação. Evite dirigir ou operar máquinas até a visão normalizar.

Se ocorrer irritação ou alergia, descontinue o uso e consulte um médico.

Uso em crianças deve ser supervisionado por um profissional de saúde.

4. MODO DE USAR

Agite antes de usar.

Usar conforme orientação médica.

Importante: Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico, mesmo com melhora dos sintomas.

5. CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida à pimaricina (natamicina) ou a qualquer componente da fórmula.

6. PRAZO DE USO

Desde que observados os cuidados de armazenamento, o medicamento possui prazo de validade de 180 dias. Não utilizar medicamentos cujo prazo de uso esteja expirado.

D. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1. DESCRIÇÃO

Suspensão Oftálmica de Pimaricina é uma suspensão estéril em veículo aquoso.

2. COMPOSIÇÃO

Pimaricina 5%

Cada mL da suspensão contém:

Pimaricina50mg

Veículo q.s.p. 1 mL

Excipientes: Tween 80, fosfato sódio monobásico anidro, fosfato sódio dibásico anidro e água para injetáveis.

3. CLASSE FARMACOLÓGICA / INDICAÇÃO

A Pimaricina é um antibiótico antifúngico do tipo polieno produzido pelo crescimento do *Streptomyces natalensis*.

Uma suspensão oftálmica a 5% de Pimaricina é usada no tratamento de blefarite, conjuntivite ou ceratite causadas por fungos sensíveis, incluindo *Fusarium solani*.

4. REAÇÕES ADVERSAS

Reações comuns:

- Irritação ocular leve.
- Lacrimejamento.
- Sensação de corpo estranho.

Reações raras:

- Reação alérgica (vermelhidão, inchaço, prurido).
- Visão turva persistente.

Lote, data de fabricação e prazo de uso: vide rótulos.