Pharmédice
Manipulações Especializadas

IODOPOVIDONA (PVP-I)

Informativo Técnico

Foto ilustrativa

A. FORMA FARMACÊUTICA
Frasco conta-gotas com 5 mL (multidose).

B. VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Uso oftálmico (Uso tópico).

C. INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. ESTABILIDADE
Manter a temperatura ambiente entre 15 a 30°C, em local seco e protegido da luz e umidade.

2. CONTRA-INDICAÇÃO
Hipersensibilidade à iodopovidona (PVP-I), iodo ou qualquer um dos excipientes da fórmula. Uso concomitante de soluções oftálmicas que contêm conservantes mercuriais. O uso é contraindicado em neonatos prematuros ou com peso inferior a 1,5 kg.

3. POSOLOGIA
Pré-operatório: duas a três gotas no saco conjuntival do olho a ser operado.
Prevenção de oftalmia gonocócica: duas gotas no saco conjuntival de ambos os olhos, logo após o nascimento.
Em ambos os esquemas, após dois minutos de contato com a conjuntiva, a solução medicamentosa deve ser cuidadosamente lavada com solução salina estéril.

4. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA
Este medicamento não deve ser utilizado concomitantemente com outros colírios. O iodo é uma substância oxidante, que pode levar a incompatibilidades com substâncias químicas redutoras. Devido ao risco de formação de compostos cáusticos, a iodopovidona (PVP-I) não deve ser utilizada com preparações contendo conservantes mercuriais, por exemplo tiomersal. Iodopovidona é inativada e tem sua atividade antimicrobiana inibida ou reduzida na presença bissulfito de sódio, tiossulfato de sódio, calor, luz e meio alcalino.

5. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
- Lave as mãos cuidadosamente;
- Incline a cabeça do paciente para trás ou deite-o olhando para cima;
- Puxe suavemente para baixo a pálpebra inferior;

REPRODUÇÃO PROIBIDA!

- Coloque o conta-gotas acima do olho. Evite o contato do conta-gotas com os dedos e com a superfície das pálpebras ou do olho, para evitar a contaminação do produto;
- Solicite o paciente olhar para cima antes de pingar uma gota de colírio;
- Após pingar o colírio, solicite o paciente olhar para baixo por alguns segundos;
- Solte a pálpebra lentamente e solicite o paciente manter os olhos fechados por um ou dois minutos. Não fechar os olhos com força para não extravasar o produto;
- Aplicar com os dedos uma pressão suave no canto do olho, junto ao nariz. Este procedimento minimiza a drenagem do produto pela fossa nasal, diminui a penetração do fármaco na corrente sanguínea e evita, assim, efeitos colaterais sistêmicos.

6. PRAZO DE USO

Desde que observados os cuidados de armazenamento, o medicamento possui prazo de validade de 180 dias. Após aberto, o medicamento deve ser utilizado em até 30 dias. Não utilizar medicamentos cujo prazo de validade esteja vencido, pois as substâncias nele contidas podem estar alteradas e causar prejuízo para a saúde do paciente.

D. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1. DESCRIÇÃO

A iodopovidona (PVP-I) é uma solução marrom escura, opaca, isotônica, não viscosa, estéril, com pH entre 4,5 e 6,5.

2. COMPOSIÇÃO

Iodopovidona(PVP-I) 5%

Cada mL da solução contém:

- Iodopovidona(PVP-I) 50mg
- Veículo q.s.p.....1 mL

Excipientes: Fosfato de sódio dibásico anidro, cloreto de sódio, glicerina e água para injetáveis.

Iodopovidona(PVP-I) 2,5%

Cada mL da solução contém:

- Iodopovidona(PVP-I) 25mg
- Veículo q.s.p.....1 mL

Excipientes: Fosfato de sódio dibásico anidro, cloreto de sódio, glicerina e água para injetáveis.

Pharmédice Manipulações Especializadas

3. CLASSE FARMACOLÓGICA / INDICAÇÃO

Iodopovidona é um iodóforo antisséptico com amplo espectro de atividade antimicrobiana, ativo contra fungos, bactérias, vírus, protozoários, cistos e esporos sensíveis ao iodo. Quimicamente, a iodopovidona ou iodeto de polivinil-pirrolidona ou PVP-I é um complexo hidrossolúvel formado por iodo, iodeto de hidrogênio e polivinilpirrolidona (PVP), com um teor de iodo ativo entre 9 e 12% calculado sobre a base seca. Em solução aquosa para uso tópico, à concentração de 2,5%, o medicamento possui ação contra Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae, sendo indicada para prevenção de oftalmia gonocócica em neonatos. Na concentração a 5%, a solução medicamentosa possui ação contra o vírus herpes simples tipo II, sendo indicada para prevenção ou tratamento de infecções oculares relacionadas à cirurgia, como no pré-operatório de cirurgias intraoculares para prevenção de endoftalmite infecciosa.

Soluções de iodopovidona liberam iodo gradualmente para exercer um efeito contra bactérias, fungos, vírus, protozoários, cistos e esporos; o iodopovidona é, portanto, menos potente do que preparações que contêm iodo livre, mas é menos tóxico.

4. REAÇÕES ADVERSAS

Reações de hipersensibilidade, com os sintomas urticária, edema de Quincke e choque anafilático podem ocorrer, apesar de serem raras as reações graves. Hiperemia conjuntival, citotoxicidade sobre as membranas mucosas e tecidos profundos e ceratite pontuada superficial. Coloração amarelo-acastanhada residual palpebral e conjuntival é comum, mas possui caráter transiente e pode ser removida com água.

Lote, data de fabricação e prazo de uso: vide rótulos.

Pharmedice
Medicamentos Especializados