



pharmédice

PAPAÍNA

Informativo Técnico



Foto ilustrativa

A. FORMA FARMACÊUTICA

Creme/Bisnaga 100 g.

B. VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dermatológico (Uso tópico).

C. INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. ESTABILIDADE

Manter em embalagem plástica, perfeitamente fechada.

Conservar sob refrigeração 2°C a 8°C.

2. PRAZO DE USO

Desde que observados os cuidados de armazenamento, o medicamento possui prazo de validade de 180 dias. Não utilizar medicamentos cujo prazo de uso esteja expirado.

3. PRECAUÇÃO

Em casos de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula, o uso deve ser imediatamente interrompido.

Evitar o uso em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao mamão.

4. MODO DE USAR

Aplicar sobre a lesão e ocluir. Remover no dia seguinte com soro fisiológico e reaplicar.

D. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1. DESCRIÇÃO

A papaína é uma enzima proteolítica que hidrolisam polipeptídeos, amidas e ésteres especialmente em ligações envolvendo aminoácidos básicos, leucina ou glicina, produzindo peptídeos de menor peso molecular.

A papaína é inativada por agentes oxidantes como ferro, oxigênio e iodo.

2. COMPOSIÇÃO

Cada 1,0 grama contém:

Papaína 0,1g.

Base autoemulsionante aniônica qsp 1,0g.

Excipientes: Propilenoglicol, hidróxido de sódio 50% (p/v).

3. CLASSE FARMACOLÓGICA / INDICAÇÃO

Indicada para o tratamento de úlceras por pressão, úlceras diabéticas, venosas e arteriais, e de queimaduras.

4. REAÇÕES ADVERSAS

Irritação cutânea: vermelhidão, ardência ou coceira no local da aplicação.

Edema inchaço: principalmente em peles sensíveis ou feridas abertas.

Dermatite de contato: reação alérgica com bolhas, descamação ou eczema.

Lote, data de fabricação e prazo de uso: vide rótulos.



pharmédice